privet Poultry Booster 850 g | 850 g



Manufacturer	priVet Farming®
Product number	4500
Weight	1kg
Length	99mm
Width	99mm
Height	222mm

Product description

Aliment complémentaire (poudre) pour volaille

Pour valoriser la nourriture des volailles à tous les âges de la vie

privet Poultry Booster is designed for healthy growth with an intensive supply of natural minerals from the HuminoMin® complex to the bones. **privet Poultry Booster** can optimize feed intake by improving the metabolic rate, which can lead to faster growth and corresponding weight gain. At the same time, joint condition and bone structure are supported and the shell strength and laying performance of laying hens can be improved. The meat quality and weight development of animals for fattening can also be improved by a natural supply of minerals and trace elements.

Composition: tourteau de pression de graines de lin, levure de bière, maërl, tourteau de pression de graines de tournesol, tourbe, herbe, plantes herbacées, légumineuses, farine d'algues marines, farine de pépins de raisin, parois cellulaires de levure de bière (MOS), marc de pomme, panais (moulu), marc d'aronite, marc de cassis, poudre de coquilles d'œuf, marc de carottes, céleri-rave (moulu), feuilles de moringa (moulu)

Additifs/kg: Additifs technologiques: clinoptilolite d'origine sédimentaire (1g568) 0,6 g, bentonite (1m558i) 0,2 g. La quantité totale de clinoptilolite d'origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10000 mg/kg. La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l'aliment complet, à savoir 20000 mg/kg d'aliment complet.

Constituants analytiques: protéine brute 35,2%, matière grasse brute 7,4%, cellulose brute 6,8%, cendres brutes 7,8%, calcium 0,82%, phosphore 0,98%, sodium 0, 14%, méthionine 0,62%, lysine 1,51%

Recommandation d'alimentation: Selon les besoins de croissance et la qualité de la nourriture, ajouter jusqu'à 20-40% de la ration journalière totale à la nourriture. En cas de besoin, par ex. en situation de stress (mue et transport),

la quantité de nourriture peut être doublée. 1 CàC correspond à env. 3 g. 1 CàS correspond à env. 9 g.

L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée. L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée. L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet.