privet Prebiotic | 500 g



Manufacturer	priVet Farming®
Product number	4855
Weight	0.35kg
Length	98mm
Width	98mm
Height	124mm

Product description

Aliment complémentaire (poudre) pour ruminants, veaux, porcs et volaille

Soutien nutritionnel-physiologique de la flore intestinale

Dans un intestin sain, l'équilibre de la flore intestinale est intact. Les bactéries pathogènes ne trouvent pas de base idéale à la vie et ne peuvent se développer que difficilement. Puisqu'une grande partie du système immunitaire est située dans l'intestin, une flore intestinale intacte favorise un système immunitaire qui fonctionne bien.

privet Prebiotic est un complément alimentaire avec un complexe minéral spécial qui a des propriétés de liaison aux toxines. Il a été spécifiquement conçu pour un soutien nutritionnel-physiologique particulièrement intense dans les troubles digestifs. En raison de la composition de la nourriture, des troubles digestifs peuvent survenir chez les volailles d'engraissement, qui sont indiqués par des matières fécales minces, par exemple. **privet Prebiotic** soutient l'intestin surtout dans le pouvoir de liaison des liquides - important pour les animaux qui ont tendance à souffrir de troubles digestifs. Le développement d'une flore intestinale saine est essentiel pour un développement sain des jeunes animaux.

Composition: tourteau de pression de graines de lin, tourteau de pression de graines de cumin noir

Additifs/kg: Additifs technologiques: bentonite (1m558i) 100 g.
La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 20000 mg/kg d’aliment complet.

Constituants analytiques: protéine brute 15,5%, matière grasse brute 4,6%, cellulose brute 5,2%, cendres brutes 16%, cendres insolubles dans HCl 14%, calcium 0,61%, phosphore 0,23%, magnesium 0,38%, sodium 0,27%, lysine

0,59%, méthionine 0,26%

Recommandation d'alimentation: ***Bovins/porcs:*** 0,5-2 g/kg à la nourriture. ***Volaille:*** 1 g/kg à la nourriture. ***Veaux:*** délayer 5-20 g/animal dans le lait. 1 CàC correspond à env. 3,5 g / 1 CàS correspond à env. 11 g.

L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée. L’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée. L’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine est contre-indiquée si la teneur en bentonite est supérieure à 5000 mg/kg d’aliment complet.

Additional information

PZN DE 19680440