

# EquiGreen Tonique pour Sabot NP 500 ml | 500 ml

## Manufacturer



**Product number** 6101

**Weight** 0.495kg

**Length** 76mm

**Width** 76mm

**Height** 161mm



## Product description

### *Aliment complémentaire (liquide) pour chevaux*

Soutien conditionné fourrager du métabolisme du sabot

Les sabots supportent l'activité de la circulation sanguine chez le cheval. La grande surface du sabot s'accompagne d'une circulation sanguine active. À chaque pas, la surface des sabots s'étend, activant ainsi une circulation sanguine optimale. Les substances nocives et les résidus métaboliques sont excrétés par la corne nouvellement formée, ce qui peut être reconnu par les anneaux ou les décolorations de la corne. Ainsi, le sabot avec son corium est un organe d'importance vitale et métaboliquement actif. Si le mécanisme du sabot fonctionne bien, le métabolisme du sabot est en équilibre. Lorsque le mécanisme du sabot est restreint, le sang s'accumule et ne peut plus soutenir l'activité de la circulation sanguine dans le corps. Avec un mécanisme de sabot restreint, qui s'accompagne d'une circulation sanguine réduite, l'augmentation des substances nocives et des résidus métaboliques doit être excrétés du corps par le foie et les reins.

Les causes fréquentes de déséquilibre du métabolisme des sabots sont une alimentation incorrecte, une sollicitation inadéquate des sabots, l'obésité et les maladies métaboliques. **EquiGreen Tonique pour Sabot NP** est spécialement aligné sur les besoins aromatiques des chevaux et des poneys dans ce contexte.

**Composition:** sel de la Mer Morte, feuilles de ginkgo, herbe d'ortie, herbe de Chardon-Marie, herbe de verge d'or, feuilles de bouleau, herbe de pensée sauvage, fleurs d'arnica des montagnes, fleurs de souci

**Additifs/kg:** Substances aromatiques: éthanol (2b02078) 76,26 g.

**Constituants analytiques:** protéine brute 0,5%, cellulose brute 1,75%, matière grasse brute 0,5%, cendres brutes 1,0%, humidité 93%, sodium 0,3%

**Recommandation d'alimentation:** Agiter avant l'utilisation. Si requis, mélanger 2 x par jour 1-2 ml/100 kg de poids corporel sous le fourrage ou donner directement dans la bouche. Pour un besoin toute l'année: 1 x par jour 0,5-1 ml/100 kg de poids corporel.

## Additional information

**PZN DE** 17512744

**PZN AT** 5463495

**Gefahrstoff** Nein

**Gefahrgut** Nein