

EquiGreen MicroMineral plus 1 kg | 1 kg

Manufacturer



Product number 1220

Weight 1kg

Length 99mm

Width 99mm

Height 222mm



Product description

Aliment complémentaire minérale (poudre) pour chevaux

Source de haute qualité de minéraux, de vitamines, d'acides aminés essentiels et d'acides humiques

Depuis plus de 10 ans, cdVet MicroMineral est une innovation quand il s'agit de fournir facilement des minéraux et des substances vitales de base dans tous les domaines. Ses ingrédients naturels, riches en micronutriments facilement disponibles, comme les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, etc. peuvent prévenir les situations de carence.

EquiGreen MicroMineral plus associe désormais cette expérience au moringa et à la tourbe pour créer un concept global inédit de vitalité et de nutriments. Le moringa se distingue par ses 90 nutriments essentiels, vitamines et minéraux, tous les acides aminés essentiels et les substances de plantes secondaires sous forme hautement concentrée. De plus, la tourbe est riche en acides humiques qui sont capables de lier l'excès d'acide gastrique et les substances nocives dans l'intestin.

- Excellente source de vitamines et de minéraux
- Moringa favorise le développement musculaire
- Source naturelle de fer - peut stimuler la formation du sang
- Régulation gastro-intestinale grâce aux acides humiques
- Protection des cellules grâce aux antioxydants

Composition: maerl, radicules de malt, tourteau de pression de graines de tournesol, farine d'algues marines, farine de pépins de raisin, levure de bière, parois cellulaires de levure de bière (MOS), moringa 5%, tourbe 3%

Additifs/kg: Additifs technologiques: clinoptilolite d'origine sédimentaire (1g568) 20 g.

La quantité totale de clinoptilolite d'origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10000 mg/kg.

Constituants analytiques: protéine brute 10,3%, cendres brutes 47,7%, cellulose brute 8,2%, matière grasse brute 3,0%, cendres insolubles dans HCl 6%, calcium 16,4%, phosphore 0,26%, sodium 0,31%

Recommandation d'alimentation: Ajouter quotidiennement 5 g/100 kg de poids corporel au fourrage. En cas de besoins particuliers, comme par ex. lors de la mue, du dernier tiers de la gestation, ainsi que pendant la lactation, la quantité de fourrage doit être augmentée à 10-20 g/100 kg de poids corporel. 1 CàS correspond à ca. 11,5 g.

Additional information

PZN DE 13660181

PZN AT 4750465

Gefahrstoff Nein

Gefahrgut Nein